

## ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

| № | Продукт, Производител  | Активно вещество                                   | Доза/дка (концентрация)   | Култура, вредител и моменти на приложение на продукта  | ЛД 50 орал но за пълъх | Карантинен срок в дни | Категория за употреба                                    |
|---|--|--|---------------------------|--|------------------------|-----------------------|--|
|   | <b>БЕЛУКА</b><br>Белхим Кроп<br>Протекшън НВ/СА<br>Разрешение №01573-1/19.03.2018 г.<br>Валидно до:<br>31.08.2021 г.<br>Заповед №РД 11-460/15.03.2018 г. | нонанова<br>(пеларгонова)<br>киселина - 680<br>г/л | 1.2-1.6<br>л продукт /дка | <b>Лозя (насаждения над 4 години)</b><br>Срещу Едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой: зимните пъпки са заострени до закръглени, светло до тъмнокафяви в зависимост от сорта; люспите на пъпките са повече или по-малко затворени в зависимост от сорта - зърната започват да се събират, грозда се затваря) При наличие на плевели<br>*Брой мин/макс приложения – 1-2<br>*Интервал между приложенията – 5-15<br>*Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка<br><b>ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с листата на културата</b> | -                      | 1                     | <b>SPe8-</b><br>Опасен за пчелите<br><br>непрофесионална |
|   |  |  | 0.9-1.6<br>л продукт /дка | <b>Лозя (насаждения над 4 години)</b><br>Отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11-65 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста - масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите)<br>*Брой мин/макс приложения – 1-3<br>*Интервал между приложенията – 15-21<br>*Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка<br><b>ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с неприцелни на третирането летораста/листа .С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ.</b>  | -                      | 1                     |  |
|   |  |  | 1.2-1.6<br>л продукт /дка | <b>Картофи</b><br>Срещу Десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81-91 (плодовете от първото плодообразуванеса все още зелени, семената-светло оцветени (главно стъбло) - начало на пожълтяване на листата)<br>*Брой мин/макс приложения – 1<br>*Интервал между приложенията – 15-21  | -                      | 1                     |  |

|           |   |                       |  |  |  |   |                     |
|-----------|---|-----------------------|--|--|--|---|---------------------|
|           |   |                       |  | *Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка<br><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване  |  |   |                     |
| <b>1.</b> | <b>ГЛИФОС УЛТРА</b><br>Хеминова А/С, Дания<br>Разрешение № 01460-<br>ПРЗ-1/14.02.2017г.<br>Валидно до:<br>31.12.2018г.<br>Заповед №11-160/<br>24.01.2017 г. | глифозат –<br>360 г/л | 0,150-1,2 л/дка  | <b>Аспержи</b><br>Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели<br>* след сеитба преди поникване   |  |   | втора професионална |
|           |   |                       | 0,150-1,2 л/дка  | <b>Овощни градини, лозя</b><br>Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели<br>* между растенията<br>* Да не се пръска при невдървесинени стъбла.<br>Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност.  |  |   |                     |
|           |   |                       | 0,150-1,2 л/дка  | <b>Свободни площи (незасети терени)</b><br>Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели<br>*Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло, пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, сорго, слънчоглед, памук, маслодайна рапица, соя, ориз, ливади, разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането. |  |   |                     |
|           |   | 0,150-1,2 л/дка       | <b>Орех (над 3 години), топола, смърч (над 2 години)</b><br>Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели<br>*между растенията<br>*Да не се пръска при невдървесинени стъбла.<br>Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност. |  |  |   |                     |
|           |   |                       | 0,150-1,2 л/дка  | <b>Ж.п. линии, Канали</b><br>Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели   |  |   |                     |
| <b>2.</b> | <b>ДЕССИКАШ 200 СЛ</b><br>Шарда Уърлдуайд<br>Експорт<br>-Удостоверение № 01259–ПРЗ / 11.08.2014г.<br>Заповед №РД 11-  | 200 г/л<br>дикват     | 250 мл/дка   | десикант при:<br><b>-картофи</b><br>*момент на приложение: ВВСН 47-49, (клубените достигат до 70% от крайното си тегло до кожицата се е оформила напълно)  |  | 7 | 1                   |

|    |  |                  |                |  |  |    |                            |
|----|--|------------------|----------------|--|--|----|----------------------------|
|    | 488/11.03.2019 г.<br>! Считано от<br>04.05.2019 г. се<br>определят 4 месеца за<br>продажба и<br>разпространение и до<br>4 февруари 2020<br>година за съхранение<br>и употреба на<br>съществуващи<br>наличности от<br>продукта за<br>растителна защита.   |                  |                |  |  |    |                            |
| 3. | ДИКВА 20 СЛ/<br>ДИМОР 20 СЛ/<br>ДИМАЗО 20 СЛ<br>Шарда Кропкем<br>ООД, Индия<br>Разрешение № 01320<br>– ПРЗ-5/<br>15.09.2016г<br>Валедно до:<br>30.06.2018 г.<br>Заповед №РД 11-<br>211/08.02.2016 г.<br>Заповед №РД 11-<br>615/19.04.2016 г. и<br>Заповед №РД 11-<br>1567/29.08.2016 г.<br>Заповед №РД 11-<br>491/11.03.2019 г.<br>! Считано от<br>04.05.2019 г. се<br>определят 4 месеца за<br>продажба и<br>разпространение и до<br>4 февруари 2020<br>година за съхранение<br>и употреба на<br>съществуващи<br>наличности от<br>продукта за<br>растителна защита. | дикват – 200 г/л | 330-500 мл/дка | десикант при:<br><b>-картофи</b><br>**момент на приложение: 1 месец преди<br>прибиране |  | 10 | втора<br>професи<br>онална |

|    |  |   |                           |   |   |                            |
|----|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------|
| 4. | <b>ДИМАЗО 20 СЛ</b><br>Шарда Кропкем<br>ООД, Индия<br>Разрешение № 01320<br>– ПРЗ-5/<br>15.09.2016г<br>Валедно до:<br>30.06.2018 г.<br>Заповед №РД 11-<br>211/08.02.2016 г.<br>Заповед №РД 11-<br>615/19.04.2016 г. и<br>Заповед №РД 11-<br>1567/29.08.2016 г. | Второ търговско име на <b>ДИКВА 20 СЛ</b> |                           |   |   |                            |
| 5. | <b>ДИМОР 20 СЛ</b><br>Шарда Кропкем<br>ООД, Индия<br>Разрешение № 01320<br>– ПРЗ-5/<br>15.09.2016г<br>Валедно до:<br>30.06.2018 г.<br>Заповед №РД 11-<br>211/08.02.2016 г.<br>Заповед №РД 11-<br>615/19.04.2016 г. и<br>Заповед №РД 11-<br>1567/29.08.2016 г.  | второ търговско име на <b>ДИКВА 20 СЛ</b> |                           |   |   |                            |
| 6. | <b>ЕКОПАРТ ТУРБО</b><br>Ничино Юръп Ко Лтд<br>Разрешение № 01387<br>– ПРЗ – 1 /<br>25.03.2016 г.<br>Валидно до:<br>30.06.2017 г.<br>Заповед № РД 11-<br>398/16.03.2016 г.<br>*Срокът на  | пирафлуфен-<br>етил 26,5 г/л              | 80 мл/дка<br>25-30 мл/дка | <b>Лозя:</b> внася се във фаза ВВСН 19-75 Девет и<br>повече листа са отворени- гроздовите зърна са<br>с размер на грахово зърно<br>Широколистни плевели, Коренови издънки<br>В комбинация с глифозат съдържащи<br>хербициди<br>*Брой мин/макс приложения – 2<br>*Интервал между приложенията (мин) - 20-30<br>дни | Лозя<br>,Ябълка,<br>Круша,<br>Дюля,<br>Мушмула,<br>Японска<br>мушмула,<br>Праскова,<br>Нектарина, | втора<br>професи<br>онална |

разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване на продукта

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 80 мл/дка<br>25-30 мл/дка | <b>Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула:</b><br>Широколистни плевели, Коренови издънки<br>В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75)<br>*Брой мин/макс приложения – 2<br>*Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни |
| 80 мл/дка<br>25-30 мл/дка | <b>Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива:</b><br>Широколистни плевели, Коренови издънки<br>В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си азмер (ВВСН 51-75)<br>*Брой мин/макс приложения – 2<br>*Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни                |
| 80 мл/дка<br>25-30 мл/дка | <b>Череша:</b><br>Широколистни плевели, Коренови издънки<br>В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (ВВСН 51-75)<br>Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер   |
| 80 мл/дка<br>25-30 мл/дка | <b>Лешник:</b><br>- Широколистни плевели, Коренови издънки<br>- В комбинация с глифозат съдържащи хербициди<br>Внася се във фаза (ВВСН 13-76) Развитие на листата-плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер<br>*Брой мин/макс приложения – 2<br>*Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни  |

Кайсия,  
Слива – 30;  
Череша – 7;  
Лешник -  
20;  
Картофи -3;  
Свободни  
площи  
Железопът-  
ни линии  
Канални  
диги  
Сухи  
канавки -

|    |   |                |                |  |   |              |                     |
|----|---|----------------|----------------|--|---|--------------|---------------------|
|    |   |                | 80 мл/дка      | <b>Картофи:</b><br>- Листна десикация<br>Внася се във фаза (ВВСН 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си тегло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза<br>*Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни                               |   |              |                     |
|    |   |                | 25-30 мл/дка   | <b>Свободни площи Железопът-ни линии<br/>Канални диги Сухи канавки</b><br>Широколистни плевели, Коренови издънки<br>*Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди<br>*Брой мин/макс приложения – 2<br>*Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни |   |              |                     |
| 7. | <b>МИШЪН 200 СЛ</b><br>Агри Кем Б.В.,<br>Холандия<br>Разрешение № 01416 – ПРЗ-1/<br>07.06.2016г.<br>Валидно до:<br>30.06.2018 г.<br>Заповед №РД 11-952/31.05.2016 г.<br>Заповед №РД 11-490 /11.03.2019 г.<br>! Считано от 04.05.2019 г. се определят 4 месеца за продажба и разпространение и до 4 февруари 2020 г. за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита. | дикват 200 г/л |                | За десикация   | - | Картофи - 10 | втора професионална |
|    |   |                | 400 мл/дка     | <b>Картофи</b>   |   |              |                     |
|    |   |                | 300-350 мл/дка | <b>Люцерна (семепроизводство)</b>  |   |              |                     |

|     |   |   |                |   |      |   |   |
|-----|---|---|----------------|---|------|---|---|
| 8.  | <b>РАУНДЪП МАКС СЛ</b><br>Монсанто Европа СА<br>-Удостоверение №<br>01261-ПРЗ<br>/11.08.2014г.<br>Валидно до:<br>01.08.2024 г.  | 480 г/л<br>глифозат<br>(под формата на<br>калиева сол-588<br>г/л) | 300 мл/дка     | Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:<br><b>Пшеница и ечемик</b><br>*като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восьчна зрялост на пшеницата |      | пшеница,<br>ечемик -14<br>дни   | 3 |
|     |   |   | 300-450 мл/дка | <b>Овощни градини (над 3 годишни дървета)<br/>Лозя (над 2 години)</b>   |      |   |   |
|     |   |   | 450 мл/дка     | <b>Ж.П. линии</b>   |      |   |   |
|     |   |   | 300-450 мл/дка | <b>Напоителни, дренажни канали и стърнища</b>   |      |   |   |
| 9.  | <b>РЕГЛОН ФОРТЕ</b><br>Синджента<br>-Удостоверение №<br>01032-ПРЗ<br>/05.03.2013г.<br>Заповед №РД 11-489<br>/11.03.2019 г.<br>! Считано от<br>04.05.2019 г. се<br>определят 3 месеца за<br>продажба и<br>разпространение и 3<br>месеца за съхранение<br>и употреба на<br>съществуващи<br>наличности от<br>продукта за<br>растителна защита. | 150 г/л дикват +<br>прилепител                                    |                | десикант/дефолиант при:   | 408  | 10-картофи;<br>7-10-<br>маслодайна<br>рапица;<br>30 за<br>всички<br>останали<br>култури | 1 |
|     |   |   | 250 мл/дка     | <b>Маслодайна рапица</b><br>При узряване на шушулките (ВВСН 87-89)  |      |   |   |
|     |   |   | 250 мл/дка     | <b>Картофи</b><br>При узряване на клубените (ВВСН43-49)   |      |   |   |
|     |   |   | 100 мл/дка     | <b>Памук</b> - внася се при 100-150 разпукани кутийки на 100 растения   |      |   |   |
|     |   |   | 150-200 мл/дка | <b>Кориандър</b> - внася се при пълно формиране на максимален брой плодове - над 75 % восьчна зрялост   |      |   |   |
|     |   |   | 250 мл/дка     | <b>Слънчоглед</b> - внася се при 25-30 % влажност на семената   |      |   |   |
|     |   |   | 250-300 мл/дка | <b>Люцерна за семенпроизводство</b> - внася се при 75-80 % жълти и кафяви чушки   |      |   |   |
|     |   |   | 300 мл/дка     | <b>Соя</b> - внася се при 60 % узрели бобове<br><b>Ориз</b> - при 25-30 % влажност на арпата  |      |   |   |
| 10. | <b>ТАЙФУН СЛ</b><br>Файнкеми Швобда,<br>Аган Кемикъл,<br>Монсанто Юръп<br>-Удостоверение<br>№01174-1/05.03.2013<br>г.<br>Валидно до:<br>18.02.2023 г.   | 360 г/л глифозат  | 400 мл./дка    | Слънчоглед, (като десикант), внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %;   | 2000 | 30 дни-<br>слънчоглед,  | 3 |
| 11. | <b>ТОРИНКА /ФР – 888</b><br>Монсанто Юръп<br>-Удостоверение №   | 360 г/л глифозат  | 400 мл./дка    | Пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант)  | 5000 | 14 дни –<br>пшеница<br>ечемик   | 2 |

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | 01172/05.03.2013 г.<br>Валидно<br>до:18.02.2023г. |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|