

Н Е М А Т О Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	П О или З	Карантинен срок в дни	Категория за употреба
1.	АФРОМИЛ Индустрис Афраса, С.А., Испания Разрешение № 01428 –ПРЗ – 1/03.08.2016 г. Валидно до: 31.01.2021 г. Заповед № РД 11- 1307/19.07.2016 г. Заповед №РД 11- 484/08.03.2019 г.	оксамил – 100 г/л	1 л/ дка	Домати, Патладжан, Пипер Срещу нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. Внася се непосредствено след засаждане/ разсаждане, чрез капково напояване * Брой мин/макс приложения – 1-3 * Интервал между приложенията (мин) – 20		21	първа професион ална
			1 л/ дка	Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Срещу нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. Внася се непосредствено след засаждане/ разсаждане, чрез капково напояване * Брой мин/макс приложения – 1-3 * Интервал между приложенията (мин) – 20			
2.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт – Белгия Удостоверение № 0144/02.02.2004 г. Валидно до: 19.12.2013 г. * Заповед № РД 09- 869/19.12.2003 г.	дазомет - 98 %	50-70 кг/дка	Галови нематоди (<i>Pod. Meloidogynae</i>) по оранжерийни домати – внася се 40-50 дни преди разсаждане		45-50 дни при почвена влага 70- 80 % от ППВ	първа професион ална
3.	ВЕЛУМ ПРАЙМ Байер АГ, Германия Разрешение № 01379– ПРЗ – 3/16.07.2019 г. Валидно до: 31.05.2025 г. Заповед № РД 11- 213/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 2621/01.12.2017 г.	флуопирам – 400 г/л	37,5-62,5мл/дка	Домати, патладжан, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеш, диня, тиква Срещу галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> , <i>Meloidogyne hapla</i>) - внася се преди или след разсаждане * Брой мин/макс приложение 2 броя I-во: 1-3 дни преди или след разсаждане II-ро: 15-30 дни след разсаждане	О	1 ден при тиквички, краставиц и, корнишон и 3 дни за домати, патладжан , пипер, пъпеш,	непрофеси онална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

<p>Заповед №РД 11-1175 от 24.06.2019 г.</p> <p>* Съществуващите количества от продукта за растителна защита ВЕЛУМ ПРАЙМ, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01379-ПРЗ-2/20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват до изчерпване на наличните количества.</p>			<p>* Интервал между приложенията (мин) - 15-30 дни</p> <p>* Вода л/дка мин/макс - 200-600 л/дка</p> <p>* По-ниската доза да се прилага при слабо до средно нападение от нематоди.</p> <p>- Продукта има и фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеш, диня, тиква</p>		диня, тиква
	62,5 мл продукт/дка	<p>Домати, пипер, патладжан</p> <p>Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne hapla</i>, <i>Meloidogyne javanica</i>, <i>Meloidogyne incognita</i>) – внася се 1-3 дни преди или след засаждане</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка</p> <p>*1. Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеш, тикви</p> <p>2. Да се прилага като нематоцид и да не се използва само за контрол на гъбни патогени.</p>	П	-	
	62,5 мл продукт/дка	<p>Краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеш, тикви</p> <p>Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne hapla</i>, <i>Meloidogyne javanica</i>, <i>Meloidogyne incognita</i>) – внася се 1-3 дни преди или след засаждане</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка</p> <p>*1. Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеш, тикви</p> <p>2. Да се прилага като нематоцид и да не се използва само за контрол на гъбни патогени</p>	П	-	
	62,5 мл продукт/дка	<p>Моркови</p> <p>Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne hapla</i>, <i>Meloidogyne incognita</i>)</p> <p>Цистообразуващи нематоди</p>	П	-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				(<i>Heterodera sp.</i>) – внася се до 10 дни преди сеитба *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка			
			62,5 мл продукт/ дка	Тютюн Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera tabacum = Globodera tabacum</i>)- внася се до 10 дни преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	-	
			62,5 мл продукт/ дка	Тютюн Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera tabacum = Globodera tabacum</i>)- внася се до 3 дни преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка	П	-	
			62,5 мл продукт/ дка	Картофи Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera pallida = Globodera pallida, Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis</i>) – внася се до 3 дни преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	П	-	
			62,5 мл продукт/ дка	Картофи Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera pallida = Globodera pallida, Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis</i>) – внася се до 3 дни преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-25 л/дка	П	-	
4.	ВИДЕЙТ 10 Г ДюПон Интернешънъл Оперейшънс Удостоверение № 0572 – ПРЗ –	оксамил – 100 г/кг	30 кг/х	Нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по моркови в доза 25 кг/ха. Прилага се при засаждане (браздово) Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по патладжан . Прилага се при засаждане		75 дни за моркови; 84 дни за картофи; за патладжан	първа професионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

<p>3/25.10.2013 г. Валидно до: 25.01.2023 г. Заповед №РД 12- 62/29.12.2006 г. Заповед №РД 11- 93/25.01.2013г. Заповед №РД 11- 1085/14.10.2013г.</p>			<p>45-55 кг/ха</p> <p>40 кг/ха</p> <p>40-55 кг/ха</p> <p>30 кг/ха</p> <p>45-55 кг/х</p> <p>30 кг/ха</p> <p>42,5-55 кг/х</p> <p>20 кг/ха</p>	<p>(браздово) Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по патладжан. Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата</p> <p>Цистообразуващи нематоди (<i>Globodera rostochiensis</i>, <i>Globodera pallida</i>) по картофи (ранни). Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата</p> <p>Цистообразуващи нематоди (<i>Globodera rostochiensis</i>, <i>Globodera pallida</i>) по картофи (основна култура). Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по домати. Прилага се при засаждане (браздово)</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по домати. Прилага се при засаждане (браздово).</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по тютюн. Прилага се при засаждане (браздово)</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по тютюн. Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата.</p> <p>*Техника на приложение: трактор с апликатор Максимален брой приложения: 1</p> <p>Телени червей (<i>Agriots spp.</i>) по картофи. Прилага се при засаждане (браздово) Техника на приложение: наземна техника Максимален брой приложения: 1</p>	<p>и, тютюн и домати не се налага</p>	
---	--	--	---	--	---------------------------------------	--

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

5.	ВИДЕЙТ 10 Л ДюПон Интернешънъл Оперейшънс – Швейцария Разрешение № 0573- ПРЗ-3/03.08.2016 г. Заповед № РД 11- 523/29.04.2013 г. Заповед №РД 11- 1305/19.07.2016 г.	оксамил – 100 г/л	1-2 л/дка	Пипер Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза веднага след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		35	първа професионална
			1 л/дка	Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза Прилага се 10-14 дни след разсаждане (ВВСН 11) до 42 дни след разсаждането (ВВСН 62)			
			1-2 л/дка	Патладжан Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза веднага след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза Прилага се 10-14 дни след разсаждане (ВВСН 11) до 42 дни след разсаждането (ВВСН 61)		28	
			1-2 л/дка	Краставици Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза веднага след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – прилага се от 10 дни до 14 дни след разсаждане (ВВСН 11)		50	
			1 л/дка	Домати (вкл. чери домати) Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза *Брой мин/макс приложения – 1 Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – прилага се 10-14 дни след разсаждане (ВВСН 11) до 42 дни след разсаждането (ВВСН 61) *Брой мин/макс приложения – 1		28	
1-2 л/дка	Тютюн Срещу Нематоди от род <i>Meloidogyne</i> - Непосредствено след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 * Високата доза е при силно нападение от неприятеля		-				

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			1 л/дка	Тютюн Срещу Нематоди от род <i>Meloidogyne</i> – внася се във фаза 10-14 дни след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията – 10-14		35	
6.	ГРАНУЛИ НЕМГУАРД ЕКОспрей Лтд, Обединено кралство Разрешение № 01577- ПРЗ-26.03.2018 г. Валидно до: 31.08.2021 г. Заповед №РД 11- 542/21.03.2018 г.	екстракт от чесън - 450 г/кг	2-2,5 кг/продукт/ дка	Моркови Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди – внася се преди сеитба или разсаждане *Брой мин/макс приложения - 1	-	-	непрофеси онална
			2-2,5 кг/продукт/ дка	Сем. Картофиви (домати, пипер, патладжан) Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди – внася се преди сеитба или разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1			
			2-2,5 кг/продукт/ дка	Сем. Тиквови (пъпеш, диня) Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди - внася се преди сеитба или разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1			
			2-2,5 кг/продукт/ дка	Марули, салати, спанак, рукула, магданоз, целина за листа Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди - внася се преди сеитба или разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1			
7.	НЕМАСОЛ 510 Таминко – Белгия Удостоверение № 0363/08.06.2006 г. Валидно до: 29.12.2015 г. * Заповед № РД 09- 719/29.12.2005 г.	метам содиум - 510 г/л	80-100 л/дка	Галови нематоди (<i>Meloidogyne arenaria</i>), почвени патогени: Фузариум (<i>Fusarium oxysporum</i>), вертицилий (<i>Verticillium dahliae</i>), корки рут (<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>), Питиум (<i>Pithium debarianum</i>), Ризоктония (<i>Rhizoctonia solani</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвените патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с	-	-	първа професион ална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				полиетилен.			
8.	НЕМАТОРИН Г Ишихара Сангио Каиша ООД – Япония Разрешение № 01117 – ПРЗ – 3/30.10.2017 г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед № РД 12- 3/18.01.2011 г. Заповед № РД 11- 2026/20.10.2016 г. Заповед №РД 11- 2065/17.10.2017 г. Заповед №РД 11- 921/30.05.2018 г.	фостиазат - 100 г/кг	3 кг/дка;	Домати Срещу галообразуващи нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.)		-	втора професионална
			1,5 кг/дка	Картофи Срещу картофена цистообразуваща нематода (<i>Heterodera rostochinensis</i>) Да не се прилага при сортове картофи с вегетационен период под 120 дни.		120	
			2 кг/дка	Картофи Срещу телени червеи (<i>Elateridae spp.</i>) – внася се по време на засаждане		120	
9.	ОЛРЕДИ Лаинко, С.А., Испания Удостоверение № 01429 – ПРЗ – 1/03.08.2016 г. Валидно до: 31.01.2021 г. Заповед №РД 11- 1308/19.07.2016 г. Заповед №РД 11- 485/08.03.2019 г.	оксамил – 100 г/л	1 л/ дка	Домати, Патладжан, Пипер, Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. – продукта се внася непосредствено след засаждане/ разсаждане * Брой мин/макс – 1-3 * Интервал между приложенията (мин) - 20		21	първа професионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

10.	МОКАП 10 Г Байер Кропсайанс – Германия Удостоверение № 0286/04.02.2005 г. Валидно до: 04.02.2005 г. Заповед № РД 09-665/09.12.2004 г. Заповед № РД11-121/18.01.2018 г. Считано от 18.01.2018 се определят 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващите наличности от продукта за растителна защита МОКАП 10 Г	етопрофос - 100 г/кг	4 кг/дка 5-8 кг/дка 15-20 кг/дка	Срещу Телени червеи (<i>Сем. Elateridae</i>) Срещу галови нематоди (<i>Pod. Meloidogyne spp.</i>) Срещу галови нематоди (<i>Pod. Meloidogyne spp.</i>)		14	първа професионална
11.	МОКАП 10 Г АМВАК Холандия Б.В., Холандия Разрешение №01596-ПРЗ-1/02.07.2018 г. Валидно до: 31.07.2020 г. Заповед № РД11-1042/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-2145/23.10.2018 г.	етопрофос – 100 г/кг	2-3 кг/продукт/ дка	Картофи – срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus, Agriotes spp.</i>) – внася се Преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1		80	Първа професионална
			5-10 кг/продукт/ дка	Домати – срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1		60	
			2-3 кг/продукт/ дка	Домати – срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus, Agriotes spp.</i>) – внася преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1		60	
			5-10 кг/продукт/ дка	Патладжан – срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се внася преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1		60	
			2-3 кг/продукт/ дка	Патладжан – срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus, Agriotes spp.</i>) – внася се		60	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		
		5-10 кг/продукт/ дка	Пипер – срещу Нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		77
		2-3 кг/продукт/ дка	Пипер – срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus</i> , <i>Agriotes</i> spp.) – внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		77
		5-8 кг/продукт/ дка	Краставици, корнишони, тиквички – срещу Нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се преди сеитба, разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		60
		2-3 кг/продукт/ дка	Краставици, корнишони, тиквички – срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus</i> , <i>Agriotes</i> spp.) – внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		60
		2-3 кг/продукт/ дка	Пъпеши, дини, тикви – срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus</i> , <i>Agriotes</i> spp.) – внася се преди сеитба, разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		80
		5-10 кг/продукт/ дка	Пъпеши, дини, тикви – срещу Нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се преди сеитба, разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		80
		5-8 кг/продукт/ дка	Минимална употреба Бамя – срещу Нематоди (<i>Meoidogyne</i> sp.) – внася се преди сеитба, разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 Забележка: Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на Мокап 10 Г за контрол на нематоди (<i>Meoidogyne</i> sp.) и телени червеи (<i>Agriotes lineatus</i> , <i>Agriotes</i> spp.) при бамя. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при		60

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				употребата на Мокап 10 Г при посочените култури, е на лицето прилагашо продукта			
			2-3 кг/продукт/ дка	Минимална употреба Бамя – срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus</i> , <i>Agriotes</i> spp.) – внася се преди сеитба, разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1		60	
12.	РЕЙСАН 51 Лайнко – Испания Удостоверение № 0524/12.07.2007 г. Валидно до: 10.07.2010 г. Заповед № РД 09-456/10.07.2007 г.	метам содиум - 420 г/л	100 л/дка	Галови нематоди при оранжерийни култури (<i>Meloidogyne arenaria</i>)	-	-	първа професионална
13.	ТЕРВИГО Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария Разрешение №01715-ПРЗ-1/08.05.2019 г. Валидно до: 30.04.2021 г. Заповед №РД 11-792 от 22.04.2019 г.	абамектин – 20 г/л	500 мл/дка	Домати Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост) *Брой мин/макс приложения – 1-6 *Интервал между приложенията – 10-14 *Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0		втора професионална
			500 мл/дка	Пипер Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост) *Брой мин/макс приложения – 1-4 *Интервал между приложенията – 10-14 *Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0		
			500 мл/дка	Патладжан Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост) *Брой мин/макс приложения – 1-4 *Интервал между приложенията – 10-14 *Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0		

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			500 мл/дка	Пъпеш, диня, тиква Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същин-ски лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост) *Брой мин/макс приложения – 1-4 *Интервал между приложенията – 10-14 *Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0		
			500 мл/дка	Краставици, тиквички Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същин-ски лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост) *Брой мин/макс приложения – 1-4 *Интервал между приложенията – 10-14 *Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0		
			500 мл/дка	Зелен фасул Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена)-пълно узряване) *Брой мин/макс приложения – 1-4 *Интервал между приложенията – 10-14 *Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0		