

НЕМАТОЦИДИ

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрац ия)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Поле (П), Оранжерия (О) или Закрито помещение (З)	Карантинен срок в дни	Категория за употреба	Забележки Начин на действие на продукта по отношение на проникван ето му в растението
1.	АФРОМИЛ Индустриас Афраза, С.А., Испания Разрешение № 01428 –ПРЗ – 1/03.08.2016 г. Заповед № РД 11- 1307/19.07.2016 г. **Заповед №РД 11- 484/08.03.2019 г. Валидно до: 31.01.2021 г.	оксамил – 100 г/л	1 л/ дка	Домати, Патладжан, Пипер Срещу нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. Внася се непосредствено след засаждане/ разсаждане, чрез капково напояване Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията (мин) – 20	О	21 дни	първа професи онална	SPe8 - Опасен за пчелите
			1 л/ дка	Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Срещу нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. Внася се непосредствено след засаждане/ разсаждане, чрез капково напояване Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията (мин) – 20				
2.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт - Белгия Удостоверение № 0144/02.02.2004 г. Заповед № РД 09- 869/19.12.2003 г. Валидно до: 19.12.2013 г. *	дазомет - 98 %	50-70 кг/дка	Галови нематоди (<i>Pod. Meloidogynae</i>) по оранжерийни домати – внася се 40-50 дни преди разсаждане		45-50 дни при почвена влага 70- 80 % от ППВ	първа професи онална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

3.	ВЕЛУМ ПРАЙМ Байер България ЕООД Разрешение № 01379– ПРЗ – 3/16.07.2019 г. Заповед № РД 11- 213/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 2621/01.12.2017 г. **Заповед №РД 11- 1175 от 24.06.2019 г. Валидно до: 31.05.2025 г.	флуопирам – 400 г/л	37,5- 62,5мл/дка	Домати, патладжан, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеш, диня, тиква Срещу галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> , <i>Meloidogyne hapla</i>) - внася се преди или след разсаждане Брой мин/макс приложение 2 броя I-во: 1-3 дни преди или след разсаждане II-ро: 15-30 дни след разсаждане Интервал между приложенията (мин) - 15-30 дни Вода л/дка мин/макс - 200-600 л/дка По-ниската доза да се прилага при слабо до средно нападение от нематоди. - Продукта има и фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеш, диня, тиква	О	1 ден при тиквички, краставици, корнишон и 3 дни за домати, патладжан, пипер, пъпеш, диня, тиква	непрофесионална
			62,5 мл продукт/дка	Домати, пипер, патладжан Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne hapla</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> , <i>Meloidogyne incognita</i>) – внася се 1-3 дни преди или след разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка 1. Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеш, тикви 2. Да се прилага като нематоцид и да не се използва само за контрол на гъбни патогени.	П	-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			62,5 мл продукт/ дка	Краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеши, тикви Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne hapla</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> , <i>Meloidogyne incognita</i>) – внася се 1-3 дни преди или след разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка 1. Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеши, тикви 2. Да се прилага като нематоцид и да не се използва само за контрол на гъбни патогени	П	-		
			62,5 мл продукт/ дка	Моркови Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne hapla</i> , <i>Meloidogyne incognita</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera sp.</i>) – внася се до 10 дни преди сеитба Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка	П	-		
			62,5 мл продукт/ дка	Тютюн Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera tabacum = Globodera tabacum</i>)- внася се до 10 дни преди разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	-		
			62,5 мл продукт/ дка	Тютюн Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera tabacum = Globodera tabacum</i>)- внася се до 3 дни преди разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка	П	-		

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			62,5 мл продукт/дка	Картофи Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera pallida = Globodera pallida, Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis</i>) – внася се до 3 дни преди засаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	П	-		
			62,5 мл продукт/дка	Картофи Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) Цистообразуващи нематоди (<i>Heterodera pallida = Globodera pallida, Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis</i>) – внася се до 3 дни преди засаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-25 л/дка	П	-		
4.	ВИДЕЙТ 10 Г ДюПон - Швейцария Удостоверение № 0572 – ПРЗ – 3/25.10.2013 г. Заповед №РД 12-62/29.12.2006 г. Заповед №РД 11-93/25.01.2013г. Заповед №РД 11-1085/14.10.2013г. Валидно до: 25.01.2023 г.	оксамил – 100 г/кг	30 кг/х 45-55 кг/ха 40 кг/ха 40-55 кг/ха 30 кг/ха	Нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по моркови в доза 25 кг/ха. Прилага се при засаждане (браздово) Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по патладжан . Прилага се при засаждане (браздово) Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по патладжан . Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата Цистообразуващи нематоди (<i>Globodera rostochiensis, Globodera pallida</i>) по картофи (ранни) . Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата Цистообразуващи нематоди (<i>Globodera rostochiensis, Globodera pallida</i>) по картофи (основна култура). Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по домати . Прилага се при засаждане		75 дни за моркови; 84 дни за картофи; за патладжан и, тютюн и домати не се налага	първа професионална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			45-55 кг/х 30 кг/ха 42,5-55 кг/х 20 кг/ха	(браздово) Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по домати . Прилага се при засаждане (браздово). Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по тютюн . Прилага се при засаждане (браздово) Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по тютюн . Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата. Техника на приложение: трактор с апликатор Максимален брой приложения: 1 Телени червей (<i>Agriots spp.</i>) по картофи . Прилага се при засаждане (браздово) Техника на приложение: наземна техника Максимален брой приложения: 1				
5.	ВИДЕЙТ 10 Л ДюПон България ЕООД Разрешение № 0573- ПРЗ-3/03.08.2016 г. Заповед № РД 11- 523/29.04.2013 г. Заповед №РД 11- 1305/19.07.2016 г. Валидно до: 29.04.2023 г.	оксамил – 100 г/л	1-2 л/дка	Пипер Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза веднага след засаждане Брой мин/макс приложения – 1		35 дни	първа професи онална	
			1 л/дка	Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза Прилага се 10-14 дни след засаждане (ВВСН 11) до 42 дни след засаждането (ВВСН 62)				
			1-2 л/дка	Патладжан Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза веднага след засаждане Брой мин/макс приложения – 1 Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза Прилага се 10-14 дни след засаждане (ВВСН 11) до 42 дни след засаждането (ВВСН 61)				
			1-2 л/дка 1 л/дка.	Краставици Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза веднага след засаждане Брой мин/макс приложения – 1 Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – прилага се от 10 дни до 14 дни след засаждане (ВВСН 11)		28 дни 50 дни		

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			1-2 л/дка 1 л/дка	Домати (вкл. чери домати) Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се във фаза Брой мин/макс приложения – 1 Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – прилага се 10-14 дни след засаждане (ВВСН 11) до 42 дни след засаждането (ВВСН 61) Брой мин/макс приложения – 1		28 дни		
			1-2 л/дка	Тютюн Срещу Нематоди от род <i>Meloidogyne</i> - Непосредствено след засаждане Брой мин/макс приложения – 1 Високата доза е при силно нападение от неприятеля		-		
			1 л/дка	Тютюн Срещу Нематоди от род <i>Meloidogyne</i> – внася се във фаза 10-14 дни след засаждане Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14		35 дни		
6.	ВОТИВО БАСФ СЕ/BASF SE, Федерална република Германия Разрешение № 01887- ПРЗ-1/16.10.2020 г. ** Заповед №РД 11- 2278/09.10.2020 г. Валидно до: 30.09.2024 г.	Bacillus firmus I-1582 - 240 г/л (1,7x10 ¹⁰ CFU/г)	20,8 мл продукт (5 грама активно вещество, съответстващо на 3,55 CFU 10 ¹¹ /сеитбена единица) Посевна норма – 0,2-0,24 сеитбени единици/дка	Царевича Галови нематоди: южна галова нематода (<i>Meloidogyne incognita</i>) Цистообразуващи нематоди: цвеклова цистообразуваща нематода (<i>Heterodera schachtii</i>) Свободно живеещи коренови нематоди (<i>Pratylenchus sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1	3	-	втора професионална	Една сеитбена единица е 50 000 семена. Посевна норма – максимално 0,24 сеитбени единици/дка = 12 000 семена/дка С несистемно действие

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

7.	ГРАНУЛИ НЕМГУАРД ЦБЦ С.р.л./СВС (Еуроге) S.r.l, Италия Разрешение № 01577- ПРЗ-1/26.03.2018 г. Заповед №РД 11- 542/21.03.2018 г. Валидно до: 31.08.2021 г.	екстракт от чесън - 450 г/кг	2-2,5 кг/продукт/ дка	Моркови Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди – внася се преди сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения - 1	-	-	непрофе сионална	
			2-2,5 кг/продукт/ дка	Сем. Картофови (домати, пипер, патладжан) Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди – внася се преди сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1				
			2-2,5 кг/продукт/ дка	Сем. Тиквови (пъпеш, диня) Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди - внася се преди сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1				
			2-2,5 кг/продукт/ дка	Марули, салати, спанак, рукула, магданоз, целина за листа Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди - внася се преди сеитба или разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1				
8.	НЕМАСОЛ 510 Суммит Агро България ЕООД Удостоверение № 0363/08.06.2006 г. Заповед № РД 09- 719/29.12.2005 г. Валидно до: 29.12.2015 г. *	метам содиум - 510 г/л	80-100 л/дка	Галови нематоди (<i>Meloidogyne arenaria</i>), почвени патогени: Фузариум (<i>Fusarium oxisporum.</i>), вертицилийум (<i>Verticillium dahliae</i>), корки рут (<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>), Питиум (<i>Pithium debarianum</i>), Ризоктония (<i>Rhizoctonia solani</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвените патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.	-	-	първа професи онална	
9.	НЕМАТОРИН Г ИСК Биосайънсис Юръп АД, Белгия	фостиазат - 100 г/кг	3 кг/дка;	Домати Срещу галообразуващи нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>)		-	втора професи	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

	Разрешение № 01117 – ПРЗ – 4/15.11.2019 г. Заповед № РД 12-3/18.01.2011 г. Заповед № РД 11-2026/20.10.2016 г. Заповед №РД 11-2065/17.10.2017 г. Заповед №РД 11-921/30.05.2018 г. **Заповед №РД 11-2221 от 11.11.2019 г Валидно до: 31.10.2020 г.		1,5 кг/дка	Картофи Срещу картофена цистообразуваща нематода (<i>Heterodera rostochinensis</i>) Да не се прилага при сортове картофи с вегетационен период под 120 дни.		120 дни	онална	
			2 кг/дка	Картофи Срещу телени червеи (<i>Elateridae spp.</i>) – внася се по време на засаждане		120 дни		
10.	ОЛРЕДИ Лаинко, С.А., Испания Удостоверение № 01429 – ПРЗ – 1/03.08.2016 г. Заповед №РД 11-1308/19.07.2016 г. **Заповед №РД 11-485/08.03.2019 г. Валидно до: 31.01.2021 г.	оксамил – 100 г/л	1 л/ дка	Домати, Патладжан, Пипер, Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. – продукта се внася непосредствено след засаждане/ разсаждане Брой мин/макс – 1-3 Интервал между приложенията (мин) - 20	О	21 дни	първа професионална	SPe8 - Опасен за пчелите.
11.	РЕЙСАН 51 Агротрейд ООД - България Удостоверение № 0524/12.07.2007 г. Заповед № РД 09-456/10.07.2007 г. Валидно до: 10.07.2010 г.	метам содиум - 420 г/л	100 л/дка	Галови нематоди при оранжерийни култури (<i>Meloidogyne arenaria</i>)	-	-	първа професионална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

12.	ТЕРВИГО Синджента България ЕООД Разрешение №01715- ПРЗ-1/08.05.2019 г. **Заповед №РД 11- 792 от 22.04.2019 г. Валидно до: 30.04.2021 г.	абамектин – 20 г/л	500 мл/дка	Домати Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-6 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0	-	втора професи онална	SPe 8 - Опасен за пчелите
			500 мл/дка	Пипер Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0	-		
			500 мл/дка	Патладжан Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0	-		
			500 мл/дка	Пъпеш, диня, тиква Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същин- ски лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0	-		
			500 мл/дка	Краставици, тиквички Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същин- ски лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0	-		

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			500 мл/дка	Зелен фасул Срещу Галови нематоди (<i>Meloidogyne</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена)-пълно узряване) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка	3/0	-		
--	--	--	------------	---	-----	---	--	--

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
 ** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията