

## ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Поле (П), Оран жери я (О) или Закри то поме щение (З)	Карантинен срок в дни	Категория за употреба	Забележ ка  Действи е на продукт а по отноше ние на проник ването му в растени ето
1.	<b>БЕЛУКА</b> Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия Разрешение № 01573-ПРЗ- 2/29.10.2021 г. <a href="#">Заповед №РД 11- 460/15.03.2018 г.</a> ** <a href="#">Заповед №РД 11- 1596 от 12.07.2021 г.</a> <a href="#">Заповед №РД 11- 2360 от 13.10.2021 г.</a> Валидно до:	<a href="#">пеларгонова (нонанова) киселина</a> - 680 г/л	1.2-1.6 л продукт /дка	<b>Лозя (съществуващи насаждения над 4 години)</b> Срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой: зимните пъпки са заострени до закръглени, светло до тъмнокафяви в зависимост от сорта; люспите на пъпките са повече или по-малко затворени в зависимост от сорта - зърната започват да се събират, грозда се затваря) При наличие на плевели Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 5-15 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка Да се избягва контакт с листата на културата	П	1 ден	втора професионална	<b>SPe8-</b> Опасен за пчелите  несистемно действие

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

31.08.2022 г.   **	0.9-1.6 л продукт /дка	<b>Лозя ( съществуващи насаждения над 4 години)</b> Отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11-65 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста - масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 15-21 Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка Да се избягва контакт с неприцелни на третирането летораста/листа .С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ		1 ден		
	1.6 л продукт /дка	<b>Лозя (маточници, млади растения)</b> Срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой- зърната започват да се събират, грозда се затваря) Плевели в период на растеж до 10 см Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 5-15 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка Да не се допуска контакт с листата на културата	П	-		
	1.2-1.6 л продукт /дка	<b>Каргофи</b> Десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81-91 (плодовете от първото плодообразуванеса все още зелени, семената-светло оцветени (главно стъбло) - начало на пожълтяване на листата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване		1 ден		

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

1.6 л продукт /дка	<b>Овощни видове (съществуващи насаждения)</b> Срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой-продукцията е прибрана) Плевели в период на растеж до 10 см. Височина Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка Да не се допуска контакт с листата на културата	П	-
1.6 л продукт /дка	<b>Пътеки между редовете при зеленчуци – съществуващи насаждения</b> Срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (сухо семе - плододаване / образуване на плода) Плевели в период на растеж до 10 см Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка Да не се допуска контакт с листата на културата	П	-
1.6 л продукт /дка	<b>Семкови, костилкови овощни видове, цитрусови култури; черупкови култури</b> Срещу издънки – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой-продукцията е прибрана) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на 3 процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

1.6 л продукт /дка	<p><b>Зеленчукови култури, картофи, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, билки, подправки, маслодайна рапица, слънчоглед, зърнено-житни култури, царевица за зърно, захарно цвекло, етерично – маслени култури, цветя, декоративни и горски видове</b></p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка Контрол на плевелната растителност след показване на кълна от семето, но преди поникване на културата</p>	П	-
1.6 л продукт /дка	<p><b>Семкови и костилкови овощни видове, черупкови култури, лозя (десертни и винени сортове) зеленчукови култури, картофи, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, билки, подправки, маслодайна рапица, слънчоглед, царевица за зърно, захарно цвекло, етерично – маслени култури, нар, маслини, киви, цветя, декоративни и горски видове</b></p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди засаждане и преди засяване Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-
1.6 л продукт /дка	<p><b>Зеленчукови култури, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, тиквови култури, сладка царевица, билки, подправки, салатно цвекло, етерично – маслени култури, цветя, декоративни и горски видове</b></p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 10-97 (начало развитие на листата – стареене/покой) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на <sup>4</sup>процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			1.6 л продукт /дка	<p><b>Дребни плодове: къпина, логанбери, хибриди от род <i>Rubus</i>, малина, боровинка, черна боровинка, червена боровинка, цариградско грозде, касис, червено френско грозде, шипка, черница, бъз</b></p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой: листните пъпки и дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи – продукцията е прибрана)</p> <p>Брой мин/макс приложения – 1-2</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-		
			1.6 л продукт /дка	<p><b>Дребни плодове: къпина, логанбери, хибриди от род <i>Rubus</i>, малина, боровинка, черна боровинка, червена боровинка, цариградско грозде, касис, червено френско грозде, шипка, черница, бъз</b></p> <p>Срещу издънки – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой: листните пъпки и дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи – продукцията е прибрана)</p> <p>Брой мин/макс приложения – 1-2</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-		
			1.2-1.6 л продукт /дка	<p><b>Соя</b></p> <p>Прилага се като десикант – във фаза ВВСН 81-99 (начало на зреенето: начало на узряването на шушулките и семената – реколта (семена))</p> <p>Брой мин/макс приложения – 1-2</p> <p>Интервал между приложенията – 5 дни</p> <p>Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-		
2.	<b>ГЛИФОС УЛТРА</b> Хеминова България и Румъния ЕООД Разрешение №	<a href="#">глифозат</a> – 360 г/л	0,150-1,2 л/дка	<p><b>Аспержи</b></p> <p>Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели след сеитба преди поникване</p>	П		втора професионална	

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

	<p>01460-ПРЗ-1/14.02.2017г.  <a href="#">Заповед №11-160/24.01.2017 г.</a>          Валидно до:          31.12.2018 г. *</p>		<p>0,150-1,2 л/дка</p>	<p><b>Овощни градини, лозя</b>          Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели между растенията          Да не се пръска при невдървесинени стъбла.          Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност.</p>				
			<p>0,150-1,2 л/дка</p>	<p><b>Свободни площи (незасети терени)</b>          Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели          Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло, пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, сорго, слънчоглед, памук, маслодайна рапица, соя, ориз, ливади, разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането.</p>				
			<p>0,150-1,2 л/дка</p>	<p><b>Орех (над 3 години), топола, смърч (над 2 години)</b>          Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели между растенията          Да не се пръска при невдървесинени стъбла.          Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност.</p>				
			<p>0,150-1,2 л/дка</p>	<p><b>Ж.п. линии, Канали</b>          Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели</p>				
<p>3.</p>	<p><b>ЕКОПАРТ ТУРБО</b>          Ничино Юръп Ко Лтд. Обединено кралство          Разрешение № 01387 –ПРЗ–1/25.03.2016 г.  <a href="#">Заповед № РД 11-398/16.03.2016 г.</a>          Валидно до:          30.06.2017 г. *</p>	<p><a href="#">пирафлуфен-етил</a>          26,5 г/л</p>	<p>80 мл/дка          25-30 мл/дка</p>	<p><b>Лозя</b>          Внася се във фаза ВВСН 19-75 Девет и повече листа са отворени- гроздовите зърна са с размер на грахово зърно          Широколистни плевели, Коренови издънки          В комбинация с глифозат съдържащи хербициди          Брой мин/макс приложения – 2          Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни</p>		<p>Лозя          ,Ябълка,          Круша,          Дюля,          Мушмула,          Японска мушмула,          Праскова,          Нектарина,          Кайсия,</p>	<p>втора професионална</p>	

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

80 мл/дка 25-30 мл/дка	<b>Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула</b> Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложеньта (мин) - 20-30 дни
80 мл/дка 25-30 мл/дка	<b>Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива</b> Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си азмер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложеньта (мин) - 20-30 дни
80 мл/дка 25-30 мл/дка	<b>Череша</b> Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (ВВСН 51-75) Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер
80 мл/дка 25-30 мл/дка	<b>Лешник</b> - Широколистни плевели, Коренови издънки - В комбинация с глифозат съдържащи хербициди Внася се във фаза (ВВСН 13-76) Развитие на листата-плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложеньта (мин) - 20-30 дни

Слива – 30 дни;  
Череша – 7 дни;  
Лешник -20 дни;  
Картофи -3 дни;  
Свободни площи  
Железопътни линии  
Канални диги  
Сухи канавки -

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на 7 процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			80 мл/дка	<b>Картофи</b> - Листна десикация Внася се във фаза (ВВСН 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си тегло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза Интервал между приложението (мин) - 7-14 дни				
			25-30 мл/дка	<b>Свободни площи Железопът-ни линии</b> <b>Канални диги Сухи канавки</b> Широколистни плевели, Коренови издънки Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложението (мин) - 7-14 дни				
4.	<b>МИЗУКИ</b> Ничино Юръп Ко., Лтд С/О, Лафер & Партньър ВТХ ГмбХ, Австрия Разрешение № 02018-ПРЗ- 1/14.04.2022 г. <b>**Заповед №РД 11- 641 от 31.03.2022 г.</b> Валидно до: 31.03.2032 г.	Пирафлуфен-етил – 10,6 г/л	200 мл/дка	<b>Картофи</b> Внася се във фенофаза на културата ВВСН 91 (Начало на пожълтяване листата) Преди прибиране на реколтата (юни-октомври) Брой приложения мин/макс: 1- 2 Интервал между приложението (мин) - 5 дни	П	7 дни	Втора професионална	
5.	<b>РАУНДЪП МАКС СЛ</b> Монсанто Европа С.А., Белгия Удостоверение № 01261– ПРЗ/11.08.2014 г. <b>Заповед РД 11-1268 от 01.08.2014</b> Валидно до: 01.08.2024 г.	480 г/л <u>глифозат</u> (под формата на калиева сол-588 г/л)	300 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: <b>Пшеница и ечемик</b> *като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восьчна зрялост на пшеницата		пшеница, ечемик -14 дни	3	
			300-450 мл/дка	<b>Овощни градини (над 3 годишни дървета)</b> <b>Лозя (над 2 години)</b>				
			450 мл/дка	<b>Ж.П. линии</b>				
			300-450 мл/дка	<b>Напоителни, дренажни канали и стърнища</b>				

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията



6.	<b>ТАЙФУН СЛ</b> Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия Разрешение №01174-3/31.03.2021 г. <a href="#">Заповед №РД 11 - 195 от 18.02.2013г.</a> <a href="#">Заповед №РД 11-611 от 25.03.2021 г.</a> Валидно до: 18.02.2023 г.	<a href="#">Глифозат</a> - 360 г/л	400 мл./дка	Слънчоглед, (като десикант), внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %;		30 дни-слънчоглед,	3	
7.	<b>ТОРИНКА /ФР – 888</b> Си Пи Агро - Ирландия Удостоверение № 01172/05.03.2013 г. <a href="#">Заповед №РД 11-196/18.02.2013 г.</a> Валидно до: 18.02.2023г.	<a href="#">глифозат</a> - 360 г/л	200 мл./дка  400 мл./дка  400-1000 мл./дка  500 мл./дка  1000 мл./дка  1000 мл./дка	Памук, тютюн, внесен преди сеитба (разсаждане) на културите - при 5-10 см височина на плевелите; Максимален брой приложения: 1 за следните култури: памук, тютюн, пасища, пшеница, ечемик и 2 за следните култури: топола, орех, смърч овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали, ЖП линии Количество на работен разтвор: 10 – 20 л/дка Пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант) Овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели) Топола, орех (над 3 г.), смърч (над 2 г.) - при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели ЖП линии (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели) Пасища (срещу орлова папрат <i>Pteridium aquilinum</i> – при пълно развитие на плевела, локално третиране)		памук, тютюн, овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали, топола, орех, смърч, ЖП линии – 7 дни; пасища – 10 дни; пшеница и ечемик – 14 дни	2	

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията