



## КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ/УМЪРТВЯВАТ ПТИЦИ ВЪВ ФЕРМАТА

Птиците, които не могат да бъдат транспортирани, трябва да се умъртвяват във фермата. Те могат също да бъдат умъртвявани във фермата поради причини като заболяване, бавен растеж или за доставяне на месо директно на потребителите/търговците на дребно. Предварителното зашеметяване е задължително във всички случаи. Зашеметете и ги **умъртвете възможно най-скоро**, така че смъртта да е безболезнена. Тази информация не отменя **националните правила**, които забраняват или ограничават някои от тези практики.


Операциите по зашеметяване и умъртвяване трябва да бъдат извършвани от работници с подходящо ниво на компетентност.

### ЗА ПТИЦИТЕ

- Птиците са социални животни, но могат бързо да получат паника
- Харесват:** добре осветени зони
- Не харесват:** пряка слънчева светлина, течение

### ПОМНЕТЕ

- Наранените птици може да не могат да се движат безболезнено. Зашеметете и ги умъртвете, където се намират, **възможно най-бързо**



## ЗАШЕМЕТЯВАНЕ/ УМЪРТВЯВАНЕ

След като сте фиксирали птиците, може да обмислите следните методи:

### 1. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ САМО НА ГЛАВАТА

Тъй като този метод може да не умъртви птиците, трябва да обезкръвите птицата в рамките на 15 секунди.

#### Разположете електродите

Електродите се поставят около главата на птицата, **между окото и ухото**

#### Проверете настройките

- Ток: пилета 240 mA; пуйки 400 mA или повече
- Напрежение: над 110 V
- Времетраене: най-малко 7 секунди

### Проверете за съзнание

След като използвате метода за електрическо зашеметяване само на главата, проверете за:

няма редовно дишане –  
проверете между краката

втвърдени крака  
(освен ако не са  
окачени)

бързо треперене


крила близо  
до тялото

извита шия

няма мигане (спонтанно  
или при докосване  
на очите)

няма реакция при  
щипане/бодване  
по гребена

няма шум



## 2. ПРОНИКВАЩ/НЕПРОНИКВАЩ ПРИХВАНАТ БОЛТ


Проникващият прихванат болт се изстрелва през черепа в мозъка. Непроникващият прихванат болт удря челото, без да прониква в черепа.

### Позиционирайте болта

- ✦ Поставете болта отгоре върху челото, като сочите надолу

### Проверете параметрите

- ✦ Прочетете инструкциите на производителя, за да проверите дали болтът, зарядът и налягането са подходящи
- ✦ Непроникващ: с плоска глава за пилетата; с изпъкнала глава за патици, гъски и пуйки
- ✦ Умъртвете чрез обезкръвяване в рамките на 1 минута




## 3. ПРЕЧУПВАНЕ НА ШИЙНИТЕ ПРЕШЛЕНИ

Пречупването на шийните прешлени (или опъване) отделя гръбнака от главата. Можете да умъртвите не повече от 70 птици на ден с този метод.

### Фиксирайте и позиционирайте птицата

- ✦ Използвайте едната ръка, за да повдигнете и дръжте птицата за краката ѝ
- ✦ Сключете пръстите на другата си ръка около шията на птицата зад черепа ѝ
- ✦ С едно непрекъснато движение:
  1. Дръпнете двете си ръце бързо и силно в противоположните посоки
  2. Откъснете главата назад бързо



## 4. ПРИЧИНЯВАНЕ НА РЯЗЪК УДАР В ГЛАВАТА


Можете да умъртвите не повече от 70 птици на ден с този метод.

### Фиксирайте и позиционирайте птицата

- ✦ Дръжте птицата за краката
- ✦ Положете главата ѝ на твърда повърхност
- ✦ Ударете задната страна на главата на птицата с тежък, лесен за манипулиране предмет

### Проверете за съзнание

След като използвате прихванат болт, удар в главата или методи за пречупване на прешлените, проверете за:



## СЛЕД ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

### Ако птицата все още е в съзнание:

- ✦ Не обезкръвявайте
- ✦ **Зашемерете отново с резервен метод**
- ✦ Открийте какво се е объркало
- ✦ Коригирайте всякакви проблеми, преди да възобновите зашеметяването

### За да потвърдите смъртта на птицата, проверете за:

- ✦ Липса на спонтанно движение
- ✦ Отпуснат труп/крила
- ✦ Няма дишане
- ✦ Обезкръвяването е спряло

